


BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP-4-8-87492193 FRANCE



Ministère de l'Agriculture SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX 47, Rue Paul Doumer - 93100 MONTREUIL. tél: 42/87/76/71.

PUBLICATION PERIODIQUE CPP Nº 536 A D Abonnement annuel : 150 F. Régisseur des Recettes : D.D.A. C.C.P. 9063 96 U PARIS . D.R.A.F

# EDITION GRANDES CULTURES

# BULLETIN N° 364 DU 22 JUIN 1987 - ENVOI N° 14

: Alternaria sur siliques à Mondreville (77) COLZA

TOURNESOL : Seul le beau temps va freiner les maladies.

Le Botrytis progresse sur gousses. POIS

: De la Fusariose sur épis. BLE

BETTERAVE : Stratégie de traitement.

# COLZA

# ALTERNARIA :

- Sud SEINE & MARNE : Ponctuellement, dans la région de Mondreville, on observe des taches d'Alternaria brassicae sur siliques. (Les températures plus clémentes du Sud SEINE & MARNE ayant favorisées cette progression). Intervenir rapidement avec : Kidan 1kg, Rovral 21, Sumisclex liquide
- Autres régions : Surveillez vos parcelles surtout en fond de vallée et zones abritées. Le retour du beau temps devrait limiter la maladie.

QUELLE QUE SOIT LA REGION, NE PLUS TRAITER A PARTIR DE TROIS SEMAINES AVANT LA RECOLTE.

### TOURNESOL

# MALADIES :

Avec les pluies, on note une évolution du nombre de boutons floraux atteints par le sclérotinia.

La plupart d'entre eux montrent des symptômes qui ont été recouverts par la pourriture grise. Celle-ci aura un effet bénéfique en cicatrisant les

Des différences importantes sont constatées entre variétés :

- RODEO est souvent très atteinte,
- MIRASOL est un peu moins sensible ,
- FRANKASOL et IS 7111 sont nettement moins touchées.

Les applications curatives ne présentent aucun interêt . Les applications de type préventif n'ont jamais permis de montrer un effet positif évident, contrairement au colza.

P.21

EN ACCORD AVEC L'INRA, NOUS DECONSEILLONS TOUTE INTERVENTION. SEULE L'AMELIORATION DES CONDITIONS METEO, ENFIN PREVUE POUR CETTE SEMAINE, POURRA STOPPER LA MALADIE.

## POIS

## TORDEUSE

Une reprise conséquente du vol a été notée autour du 15 juin dans la région de Rambouillet et zones limitrophes de l'Eure et l'Eure et Loir. En raison des pluies, les traitements éventuels à base d'organo- phosphorés (Azofène, Zolone Flo ) sont lessivés. Prévoir un renouvellement rapide pour les pois de semence ou conserverie. Les traitements à base de pyréthrinoïde (Sumicidin 10) sont moins dépendants des conditions climatiques.

NB : Fastac vient d'être homologué contre la tordeuse à 0,25 l|ha. En SEINE & MARNE et ESSONNE , pas de nouvelles captures cette semaine.

#### PUCERONS :

Les populations sont en augmentation. Uniquement sur variétés tardives, un insecticide pourra être utilisé si l'on dépasse 30 pucerons par plante.

#### BOTRYTIS :

Les conditions météorologiques sont toujours favorables. Nous renouvelons notre conseil de traitement avec de la carbendazime (propriété systémique 400 g/ha.)

## BLE

#### PUCERONS

Les infestations faibles ne justifient pas d'intervention. La période de sensibilité à ce ravageur prend fin au stade grain pâteux.

#### MALADIE :

La période pluvieuse a favorisé des contaminations de septoriose, son extension est toutefois ralentie par les températures fraîches. Les rouilles n'évoluent pas. Sur épis, des symptômes de fusariose commencent à apparaître.

## POMME DE TERRE

N'hésitez plus pour faire votre premier traitement contre le mildiou.

\*\*\*